

Ficha Técnica LARV-MAX

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: LARV-MAX

Nome Comum: Piriproxifem

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0072

Composição química:

PIRIPROXIFEM: 4-phenoxyphenyl (RS)-
2-(2-pyridyloxy)propyl ether

COMPOSIÇÃO:

PIRIPROXIFEM.....20,0% (p/p)
Inertes (dispersante, atenuador de espuma, umectante,
conservante, desnaturante, espessante e veículo)
.....80,0% (p/p)

INDICAÇÕES DE USO:

LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), larva de mosca (*Musca domestica*) e larva de cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos.

PRECAUÇÕES: •CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! •CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. •Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. •Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. •Não fumar ou comer durante a aplicação. •Manter o produto na embalagem original. •Não reutilizar as embalagens vazias. •Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. •Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. •Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. •Não aplicar em água potável.

PRIMEIROS SOCORROS: •Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. •Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. •Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. •Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO

Nome Comum: PIRIPROXIFEM

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico
Anti-histamínicos, Tratamento Sintomático

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018